

# Tularémie



| Maladie                               | Bactérienne <input checked="" type="checkbox"/>   | Virale <input type="checkbox"/> | Parasitaire <input type="checkbox"/>   | Autre <input type="checkbox"/>                                       |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|
| Principales espèces animales touchées | Essentiellement les rongeurs (campagnols,mulots,écureuils),et les lagomorphes (lièvre,plus rarement lapin de garenne) sont sensibles à la maladie.Mais d'autres mammifères y sont peu ou pas sensibles et peuvent servir de vecteurs:sanglier,chat,chien,renard.On ne connaît pas bien l'incidence de la maladie dans le reste de la faune sauvage. |                                 |  |  |
| Zoonose<br>(transmissible à l'homme)  | Oui <input checked="" type="checkbox"/>   | Non <input type="checkbox"/>    | Maladie réglementée<br>(déclaration obligatoire, mesures de police sanitaire)  | Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> |
| Résistance de l'agent contaminant     | Dans le milieu naturel :<br><br>Au froid :<br><br>Au chaud :<br><br>Aux agents chimiques :  |                                 | Faible dans cadavres,forte dans eau,sol,paille<br><br>Résistante à la congélation<br><br>Sensible<br><br>Sensible (Javel,éthanol 70%,formol) |  |

| DANS LA FAUNE SAUVAGE  |  |
|------------------------|--|
| Maladie mortelle       | Très largement mortelle pour les espèces sensibles   |
| Symptômes              | Soit comportement anormal, se laisse approcher, faiblesse, respiration accélérée et mort en 1 à 2 semaines<br>Soit septicémie immédiate et mort en 2-3 jours.  |
| Organes atteints       | Grosse rate en cigare chez le lièvre, mais pas systématique, surtout quand la mort est intervenue rapidement par septicémie.   |
| Causes de la maladie   | Bactérie <i>Francisella Tularensis holartica</i> .<br>Les lièvres sont le plus souvent contaminés par des tiques, qui sont à la fois vecteurs et réservoirs. Parfois aussi par d'autres animaux (rongeurs) |
| Période(s) critique(s) | Tout l'hiver (mais possible toute l'année)   |
| Voies de contamination | Piqûre de tique ou contact avec animal ou produit d'un animal atteint (poils, crottes, urine, sueur, salive ...)   |
| Prévention             | Eviter le lâcher de lagomorphes en général, tout particulièrement de <i>Sylvilagus</i> en provenance d'Amérique du Nord.<br>Sinon, vérifier l'état sanitaire des animaux de repeuplement.                  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Risque de passage animaux sauvages ↔ domestiques<br><br>Direct <input type="checkbox"/> Indirect <input type="checkbox"/> | Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> |   |
|   | Voies de contamination   |   |
|   | Espèces sensibles  |   |
|   | Prévention   |   |
| Risque de transmission aux chiens de chasse   | Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> |   |
|   | Dangerosité  | Sans danger pour le chien, mais devient vecteur pour l'homme. |
|   | Prévention   | Enlever les tiques.<br>Ne pas donner de cadavres de lièvres.  |

| CHEZ L'HOMME RISQUE DE TRANSMISSION** : +++ |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Gravité de la maladie                       | Mortalité : moins de 1% en Europe si cas traité. 5% si cas non traité  |  |  |  |  |  |
| Symptômes                                   | Incubation de 8-10 jours<br>Très grande fatigue, " pseudo-grippe ", puis symptômes variables : la zone de pénétration de la bactérie exprime la maladie (ulcération sur la peau, ou rhino-pharyngite, bronchite si inhalation ...)   |  |  |  |  |  |
| Organes atteints                            | Dépend de la " porte d'entrée " de la bactérie : peau et ganglions ou voies respiratoires ou voies digestives ...  |  |  |  |  |  |
| Causes de la maladie                        | Bactérie <i>Francisella Tularensis holartica</i> .<br>Touche essentiellement les personnes qui manipulent des lièvres atteints. Mais d'autres cas existent, liés au jardinage, à l'agriculture et au rôle de vecteurs des tiques.  |  |  |  |  |  |
| Période(s) critique(s)                      | Possible toute l'année mais période de chasse plus favorable   |  |  |  |  |  |
| Voies de contamination                      | Peau saine <input checked="" type="checkbox"/><br>Peau blessée <input checked="" type="checkbox"/><br>Muqueuses <input checked="" type="checkbox"/>  | Alimentation <input checked="" type="checkbox"/><br>Inhalation <input checked="" type="checkbox"/><br>Piqûre d'insecte <input checked="" type="checkbox"/> |  |  |  |  |
| Prévention                                  | Ne pas toucher les cadavres ni les animaux malades à mains nues.<br>Humecter la fourrure avant l'éviscération pour diminuer la suspension de poussière et de poils. Bien cuire la viande de lièvre. Ne pas boire d'eau stagnante.<br>Retirer les tiques le plus tôt possible.  |  |  |  |  |  |
| Traitement                                  | Antibiotiques.<br>Les personnes les plus exposées sont les chasseurs, les préparateurs de venaison, les agriculteurs manipulant la paille et le grain (poussières), les personnes pratiquant le jardinage, les laborantins, les techniciens de fédérations de chasseurs, garde-chasse, techniciens des réserves naturelles, les promeneurs en forêt. |  |  |  |  |  |
| Maladie professionnelle                     | Oui <input checked="" type="checkbox"/>  | Non <input type="checkbox"/>   |  |  |  |  |

\*\*Importance du risque de transmission : + à +++